

DIOXIS ACICLOVIR 5%

Crema Dérmica
Venta bajo receta
Industria Argentina

FÓRMULA:

Cada 100 g de crema contiene:

Aciclovir	5,00 g
Cetomacrogol, vaselina, vaselina líquida, alcohol cetosteárico fosfato monosódico, metilparabeno, propilparabeno y agua purificada c.s.p.	100 g

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antiviral.

INDICACIONES:

1. Tratamiento de la infección mucocutánea inicial o recurrente producida por Herpes simplex en pacientes inmunocomprometidos; no obstante el aciclovir sistémico es más efectivo.
2. Tratamiento adjunto de las infecciones por Herpes zóster en pacientes inmunocomprometidos que hayan comenzado tratamiento por vía sistémica con otros regímenes de tratamiento por Herpes zóster. Desarrollo de resistencia al aciclovir ha sido reportada con el tratamiento prolongado en pacientes inmunocomprometidos.

POSOLÓGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Adultos y niños: Aplicar sobre la piel o las mucosas cada 3 horas, 6 veces al día durante 7 días. La cantidad a aplicar deberá ser suficiente para cubrir adecuadamente todas las lesiones. La terapia debe ser iniciada tan pronto como sea posible, seguida a la aparición de los signos y síntomas de la infección por virus del grupo herpes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Este medicamento es para uso cutáneo exclusivo y no puede ser aplicado en los ojos.

El uso de antivirales por vía tópica puede conducir a sensibilización cutánea, resultando en reacciones de hipersensibilidad con el subsecuente uso tópico o sistémico de esta medicación.

No todos los pacientes con infecciones por virus del grupo herpes requieren tratamiento con aciclovir tópico.

Embarazo: Debido a que no han sido realizados estudios bien controlados, aciclovir no debe ser usado durante el embarazo, a menos que los posibles beneficios para la madre, superen los riesgos potenciales para el feto.

Lactancia: No es sabido aún si el aciclovir usado en forma tópica es excretado en la leche materna, por lo que se recomienda tener precaución cuando este medicamento sea indicado en mujeres amamantando.

CONTRAINDICACIONES:

La relación riesgo/beneficio deberá ser cuidadosamente evaluada en las siguientes condiciones:

- Hipersensibilidad al aciclovir tópico.
- Embarazo.
- Lactancia.

EFFECTOS ADVERSOS:

Incidencia más frecuente (28% aproximadamente): Dolor moderado, edema, ardor y/o pinchazos en el sitio de aplicación.

Incidencia menos frecuente (4% aproximadamente): Prurito.

Incidencia rara (0.3% aproximadamente): Rash cutáneo.

INTOXICACIÓN:

Ante una eventual intoxicación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse inmediatamente a los siguientes Centros de Intoxicación:

Hospital Posadas "Toxicología":

Tel.: 011-4658-7777 ó 011-4654-6648

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez:

Tel.: 011-4962-6666 ó 011-4962-2247

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE:

- No aplicar en los ojos.
- Comunique a su médico si se encuentra embarazada o está amamantando.
- Comunique a su médico si está tomando otra medicación, sea esta recetada por un profesional o de venta libre.
- Verifique la fecha de vencimiento antes de la administración de un medicamento.
- Recuerde que un medicamento beneficioso para usted puede ser perjudicial para otra persona.
- No olvide comunicar a su médico si padece alguna enfermedad concomitante o si ha presentado en alguna oportunidad alergia a este u otro medicamento.
- No suspenda bruscamente esta medicación a menos que sea indicado por su médico.
- En caso de intoxicación consulte inmediatamente a su médico o a un centro asistencial.
- Ante la aparición de cualquiera de los siguientes síntomas, suspenda la medicación y consulte inmediatamente a su médico o a un centro asistencial: Dolor, picazón, ardor y/o enrojecimiento en la zona donde se aplica este medicamento.
- Aplique este medicamento en la cantidad y con la periodicidad indicada por su médico.
- Guarde los medicamentos dentro de su envase original conservando los prospectos.

PRESENTACIÓN:

Envase conteniendo 5 g.

CONSERVACIÓN:

Conservar en lugar fresco y seco. No utilizar después de la fecha de vencimiento.

“MANTENGA ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.”

“ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN UNA NUEVA RECETA MÉDICA.”

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 40.737.

Director Técnico: Gabriel Saez, Farmacéutico.

Elaborado en: Fragata Heroína 4948, Grand Bourg, Área de Promoción El Triángulo, Ptdo. de Malvinas Argentinas, Pcia. de Buenos Aires.

Fecha de última revisión: 16/07/1992

MICROSULES ARGENTINA S.A. DE S.C.I.A.

M3060130

Ruta Panamericana Km 36,5 (B1619IEA) Garín, Pdo. de Escobar, Pcia. de Buenos Aires. Tel: 03327-452629

www.microsules.com.ar